

LES ETATS DELIRANTS DU SUJET AGE

I/ DÉFINITIONS

Délirer : « sortir du sillon » (étymologie)

Idées délirantes : jugement faux, pathologique avec une croyance inébranlable

II/ INTRODUCTION

Les symptômes délirants en gériatrie se rencontrent systématiquement dans 3 cadres :

- les délires chroniques vieillis
- les délires tardifs > 65 ans (expression d'une dépression)
- les états démentiels

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL : les états confusionnels (pathologie organique) ; tableau avec délires, hallucinations, les vieux souvenirs s'entrechoquent.

III/ LES DÉLIRES CHRONIQUES VIEILLIS

- diminuent en intensité notamment pour la schizophrénie, avec une symptomatologie résiduelle
- indifférence, retrait affectif, aboulie, négativisme, maniérisme, stéréotypes
- troubles de l'humeur bipolaire : tendance à l'espacement des cycles
- expression plus fréquente sur le mode confusionnel des accès maniaque ou mélancolique
- rechercher les antécédents

IV/ LES ÉTATS DÉLIRANTS TARDIFS > 65 ANS

I. CLINIQUE

- délire à mécanisme : interprétatif, intuitif, imaginatif, hallucinatoire
- thèmes : persécution, préjudice, hypocondriaque, intrusion
- troubles de l'humeur associés fréquemment
- troubles psychocomportementaux secondaires possibles

2. FACTEURS FAVORISANTS

- désafférentation sociale (isolement) ou sensorielle (surdit )
- modifications environnementales
- recherche d'un facteur d clenchant
- sexe f minin
- iatrog nie **

3. D FINITION

J.P Cl ment : « il s'agit d'un  tat r actionnel ou secondaire   un certain nombre de conditions pathologique » (troubles mn siques, troubles de l'humeur, carences affectives)

4. QUELQUES FORMES CLINIQUE

- le syndrome d'Ekbohm (d lire dermatozo ique) : le patient   la ferme conviction qu'il est infect  ; cette croyance est in branlable et constitue un d lire primitif ; c'est un ph nom ne isol , sans relation avec les autres troubles psychotiques
- le syndrome de Charles Bonnet : hallucinations visuelles complexes, persistantes ou r p t es, fr quemment color es ; le patient n'est pas effray 
- le syndrome du bandeau : fait suite   une op ration ophtalmologique

V/ CONDUITE   TENIR DEVANT UN PATIENT  G  D LIRANT

- toujours restituer le patient dans son contexte socio-familial
- rechercher des ant c dents psychiatriques
- analyser le traitement et les modifications r centes
- rechercher les circonstances d'apparition
- rechercher un facteur d clenchant
- examen clinique, pathologies organiques
- analyser le d lire