

# LES TUMEURS BENIGNES DU SEIN

➤ Diagnostic différentiel : *cancer du sein*.

## ★ Mode de révélation :

~ en raison d'**antécédents familiaux** : la femme consulte car il y a des antécédents de cancers du sein dans sa famille.

~ en raison d'**antécédents personnels** : une femme qui a déjà eu un cancer du sein.

~ la femme trouve une **grosseur au niveau du sein**.

~ la femme constate un **écoulement mamelonaire** (lait?, sang?, un ou les 2 seins?).

~ il est possible de voir une tumeur lors de l'*examen systématique gynécologique*.

~ la tumeur peut-être trouvé lors d'une *mammographie* ; celle ci est conseillée aux femmes à partir de 40 ans.

## ★ Diagnostic :

~ Le *diagnostic clinique* =

la *femme est assise*, on regarde si les seins sont symétriques, s'il existe une rétractation d'un mamelon, si l'un des mamelon est ombiliqué;

puis on examine la *femme allongée*, on palpe les 2 seins, si on trouve une **masse** : *mesuration / mobilité* par rapport à la peau ou au plan profond / existence d'un *caractère inflammatoire* (rougeur, chaleur, douleur) / on vérifie l'absence ou l'existence d'une *adénopathie* (au niveau des aisselles, sus-claviculaire) / on regarde si existence d'un *écoulement provoqué*.

~ *L'imagerie* =

L'échographie nous révèle l'existence d'une tumeur, sa taille, sa localisation, fait la

différence entre tumeur liquidienne (= **kyste**) et tumeur solide, nous informe sur la paroi de la tumeur (*régulière / irrégulière*), le contenu de la tumeur (*homogène / hétérogène*).

La ponction : on prélève le liquide à l'intérieur du kyste.

*La cytoponction* : on prend des cellules éparpillées afin de les analyser.

La mammographie : verra la masse, le contour et la localisation de la tumeur. Si c'est une *tumeur bénigne* : l'image sera ronde et bien nette ; si c'est une *tumeur maligne* : l'image sera stellaire.

~ *La biopsie* =

*prélèvement d'une couche de cellules* ; avec une aiguille.

Biopsie chirurgicale : on enlève la tumeur.

★ Anatomo-pathologie :

~ **fibro-adénome** ; arrive souvent aux jeunes filles, vers 18 ans. Bénin ; boule bien limitée et mobile.

~ **mastose fibro-kystique** ; arrive aux femmes vers 35 / 40 ans. Bénin ; fait peur ; grosse masse irrégulière.

~ **kyste** ; on fait une *ponction*.

~ **adénose** ; plus rare.

~ chez la *femme qui allaite* : **kyste galactophorique** (c'est le canal galactophore qui se dilate) ; **galactocels**.

★ Traitement :

Si tumeur bénigne : on ne fait rien ; surveillance ; exérèse biopsie.