PATHOLOGIES DE L'APPAREIL LACRYMAL

	Sécheresse lacrymale	Larmoiement
Épidémiologie	fréquente, surtt chez la P.A polymédicamentée	
Étiologie		exprime 1 anomalie des voies lacrymales / signe 1 imperforat° du canal lacrymo-nasal chez le nourrisson
Symptômes	sensat° de corps étranger, irritat°, brûlure, rougeur oculaire intermittente, +/- baisse de l'acuité visuelle	gêne fonctionnelle très inconfortable ; paupières collées le matin avc présence de croûtes
Facteurs déclenchant	travail visuel, pollut° environnementale	
Diagnostic	par le Test de Shirmer[1]	
Traitement	buts : pr lutter ctre l'inconfort du patient et préserver l'intégrité de la surface cornéenne	éliminer les croûtes à l'aide d'un coton imbibé d'eau claire / abstent° thérapeutique sauf si compliquée d'1 conjonctivite (collyre ATB)
	moyens : mise en oeuvre de mesures substitutive locale (= gttes oculaires / larmes artificielle) et règles hygiéno-diététique (= arrêt tabac et climatisat°, utiliser humidificateur)	

1 **est réalisé à l'aide d'une bandelette de papier buvard. Une fois appliqué à la surface de l'oeil (angle interne), la bandelette absorbe les larmes s'y trouvant afin d'en mesurer la quantité. Il permet de mesurer l'intensité de la sécrétion lacrymale.**