Pathologies des paupières

	Définition	Symptômes	Évolution	Ttt	Récidive
Ectropion	évers° du bord libre de la paupière inf, caractérisé par la perte de contact entre le bord libre de la paupière et la surface oculaire (du à l'âge)	qq fois : larmoiement chronique, irritat° oculaire, conjonctivite chronique, ...		chir (repositionn e ment de la paupière)	
Entropion	invers° du bord libre de la paupière vers la surface de l'oeil[1]	gêne oculaire, irritat°, sensat° de corps étranger +/- baisse de l'acuité visuelle		local : à base de pommade cicatrisante (Vit A) / chir : si le ttt local n'a pas fonctionné	
Ptôsis	chute de la paupière sup au delà du quart sup de la cornée (congénital ou acquis)	difficulté visuelle +/- occlus° palpébrale irréversible		chir	
Chalazion[2]	granulome de résorpt° d'1 **glde de Meilbomius** (glde lacrymale)	nodule inflammatoire ss cutané, intra-palpébrale, à distance du bord libre ; dlr ; rougeur ; conjonctivite	il pe y avoir 1 régress° spontanée, par vidange par le canal excréteur de la glde ou enkystement	ATB + AIS pdt 15 j / incis° chir si ne régresse pas	si récidives fréquente : rechercher alors 1 terrain favorisant[3]
Orgelet	infect° staphylococciq ue aiguë du follicule pilo-sébacé d'1 cil	tuméfact° inflammatoire douloureuse, localisée, du bord libre de la paupière, centré par 1 cil		médical : applicat° de compresses chaude et pommade ATB	si multiple ou récidivant : rechercher 1 diabète

1 Conséquence : frottement des cils sur la surface oculaire, d'où irritation de la cornée
2 stérile : mais peut s'infecter (staphylocoque)
3 ex : hypermétropie mal corrigée

	Définition	Symptômes	Évolution	Ttt	Récidive
		; constitu° de l'abcès ; éliminat°, rupture de l'abcès et vidange du bourbillon pileux nécrotique			
Blépharite	inflammat° de la paupière, svt chronique ; peut-être staphylococcique	présence de croûtes et de squames au bord libre ; paupière érythémateuse et oedématiée ; cils irréguliers et rare		hygiène palpébrale quotidienne (avc compresses d'eau tiède)	